

## SI PRÉSENCE D'UN OU PLUSIEURS SYMPTÔMES DE LA COVID-19

Fièvre, perte d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, grande fatigue, perte d'appétit importante, douleurs musculaires généralisées, mal de tête, toux, essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre.

### Pour L'EMPLOYÉ

Isolez-vous.

Avisez votre supérieur immédiat.

Passez un test de dépistage.

Attendez les résultats à la maison (télétravail si possible).

+

Suivez les consignes de la Santé publique

Avisez votre supérieur immédiat.

#### RETOUR AU TRAVAIL

Avisez votre supérieur immédiat une fois la levée de l'isolement confirmée par la Santé publique.

-

Avisez votre supérieur immédiat.

Bonne journée au bureau!

### Pour un membre de la FAMILLE (vivant sous le même toit)

Vous pouvez venir travailler.

Suivez les consignes de la Santé publique.

*Si vous commencez vous-même à ressentir des symptômes OU un membre de votre famille reçoit un résultat positif, référez-vous au schéma de gauche.*

#### QUELQUES RECOMMANDATIONS EN BREF

##### Enfant entre 6 mois et 5 ans

*S'il présente, depuis moins de 24 heures, un ou des symptômes, il est recommandé de le garder à la maison et d'éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l'évolution des symptômes.*

*Si un ou des symptômes persistent pendant plus de 24 h, procédez à l'autoévaluation. L'outil d'autoévaluation de la Santé publique ne remplace pas une consultation médicale mais aide à prendre une décision si un test de dépistage doit être fait ou non.*